

Génotypage du groupe sanguin fœtal en cas d'allo-immunisation

Guide pour les femmes/personnes enceintes ayant des anticorps contre les globules rouges




Le statut de vos anticorps et le groupe sanguin de votre bébé sont importants pendant la grossesse

Au début de votre grossesse, votre professionnel de la santé demandera une prise de sang pour vérifier si vous avez des anticorps.

Si des anticorps contre les globules rouges sont trouvés, cela signifie que vous avez été exposée à un groupe sanguin différent du vôtre pendant une grossesse ou une transfusion sanguine. Certains anticorps peuvent causer une maladie appelée maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né (MHFN). Votre professionnel de la santé utilisera ces résultats pour guider vos soins pendant la grossesse.

Cette information porte sur le **génotypage du groupe sanguin fœtal en cas d'allo-immunisation**. Ce test s'adresse aux personnes qui ont des anticorps **anti-D, anti-C, anti-c, anti-E ou anti-K (Kell)**.



Comprendre l'allo-immunisation pendant la grossesse

L'allo-immunisation se produit lorsque votre corps fabrique des anticorps (protéines fabriquées par votre système immunitaire) contre un groupe sanguin différent du vôtre. Cela peut arriver pendant la grossesse si le groupe sanguin de votre bébé est différent du vôtre, ou après une transfusion sanguine.

Pendant la grossesse, ces anticorps peuvent passer dans le sang du bébé par le placenta et détruire ses globules rouges. Cette maladie s'appelle la MHFN. Elle peut causer une anémie (faible nombre de globules rouges) chez le bébé. Certains bébés peuvent avoir besoin des transfusions sanguines avant ou après la naissance. Après l'accouchement, la MHFN peut aussi causer une jaunisse légère à grave (jaunissement de la peau et des yeux).

L'allo-immunisation ne cause pas toujours des complications. Votre professionnel de la santé surveillera votre grossesse et vous offrira les soins nécessaires.

Connaître le groupe sanguin de votre bébé pendant la grossesse

Le génotypage du groupe sanguin fœtal en cas d'allo-immunisation est une prise de sang faite pendant la grossesse. Ce test vérifie si votre bébé a certains marqueurs sur ses globules rouges, appelés antigènes, contre lesquels vos anticorps peuvent réagir.

→ Avantages de connaître le groupe sanguin de votre bébé

Connaître le groupe sanguin de votre bébé pendant la grossesse vous aide, avec votre professionnel de la santé, à prendre des décisions importantes sur vos soins :

- » Si le test montre que votre bébé est à risque de MHFN, votre professionnel de la santé **surveillera votre grossesse pour des signes de complications**.
- » Si le test montre qu'il n'y a pas de risque de MHFN, vous pourriez **éviter des examens** comme des prises de sang, des échographies ou des visites chez un spécialiste.



Ce test se fait à partir d'une prise de sang. De petits morceaux de l'ADN de votre bébé dans votre sang permettent de déterminer si votre bébé a l'antigène.



Ce test est très **fiable et sans danger** pour vous et votre bébé.

Comment obtenir ce test

Ce test se fait à partir de **16 semaines** de grossesse pour les anticorps **anti-D, C, c et E** et à partir de **20 semaines** pour **anti-K (Kell)**.

1

Discutez du test avec un professionnel de la santé

Si ce test vous convient, il vous remettra une requête pour que vous puissiez le faire.

2

Faites votre prise de sang

Apportez votre requête au laboratoire pour faire votre prise de sang.

3

Attendez vos résultats

Les résultats sont habituellement disponibles dans un délai de 10 jours ouvrables et sont envoyés directement au professionnel de la santé.

4

Discutez de vos résultats

Un professionnel de la santé vous indiquera les prochaines étapes et les soins de grossesse qui vous sont recommandés.



Qui peut faire ce test?

Le génotypage du groupe sanguin fœtal en cas d'allo-immunisation est financé par l'État pour toutes les femmes/personnes enceintes vivant en Ontario qui ont un ou plusieurs des anticorps suivants :

- » anti-D
- » anti-C
- » anti-c
- » anti-E
- » anti-K (Kell)

Vos résultats et les prochaines étapes

Résultat du test	Ce que cela signifie	Prochaines étapes
 Antigène positif	Votre bébé a l'antigène du groupe sanguin et est à risque de MHFN.	Un professionnel de la santé surveillera votre grossesse afin de détecter tout signe de MHFN. Cela peut inclure des prises de sang supplémentaires, des échographies et une orientation vers un spécialiste.
 Antigène négatif	Votre bébé n'a pas l'antigène du groupe sanguin et n'est pas à risque de MHFN.	Aucun changement à vos soins prénataux n'est nécessaire. Continuer vos rendez-vous réguliers avec un professionnel de la santé.

* Si le test n'a pas permis d'obtenir un résultat (**résultat non concluant ou absent**), un professionnel de la santé pourrait vous demander de refaire le test ou de traiter votre grossesse comme si votre bébé avait l'antigène.

→ À l'accouchement

À la naissance, un échantillon de sang du cordon ombilical servira à confirmer le groupe sanguin de votre bébé et à vérifier s'il a besoin d'une surveillance après l'accouchement. Le laboratoire d'analyse peut aussi recevoir les résultats pour assurer la qualité du test.

→ Que ce passe t-il si je ne fais pas ce test?

Si vous êtes allo-immunisée et que vous ne faites pas ce test, votre grossesse sera suivie comme si votre bébé avait l'antigène, avec une surveillance pour détecter tout signe de MHFN.

Pour plus d'informations : consultez le site web de Dépistage Prénatal Ontario ou appelez notre ligne d'information pour parler à un conseiller en génétique ou à un spécialiste du dépistage.

 prenatalscreeningontario.ca/fr  PSO@BORNOntario.ca
 Ligne d'information de DPO : 1-833-351-6490 ou 613-737-2281



Renseignez-vous
sur vos options de
dépistage prénatal sur
monparcoursdedepistage.ca

