


Dépistage du *RHD* fœtal

Guide pour les femmes/personnes enceintes qui sont RhD négatif




Votre groupe sanguin et celui de votre bébé sont importants pendant la grossesse

Si votre groupe sanguin est RhD négatif, le dépistage du *RHD* fœtal peut vous aider à savoir tôt dans la grossesse si votre bébé a un groupe sanguin différent du vôtre. Cette information vous aide, avec votre professionnel de la santé, à prendre des décisions importantes sur votre traitement.



Groupe sanguin et RhD

Un professionnel de la santé vérifiera votre groupe sanguin au début de votre grossesse. Il existe quatre principaux groupes sanguins : A, B, AB et O. Chacun de ces groupes peut être RhD positif ou RhD négatif. RhD est un marqueur présent à la surface de vos globules rouges. Si vous l'avez, vous êtes RhD positif. Si vous ne l'avez pas, vous êtes RhD négatif.



Si votre bébé est RhD positif et que vos sangs se mélangent, cela peut causer des complications lors de futures grossesses.

Pourquoi le RhD est-il important pendant la grossesse?

Le RhD est important si vous êtes RhD négatif et que votre bébé est RhD positif. Pendant la grossesse ou l'accouchement, une petite quantité de sang du bébé peut se mélanger au vôtre. Votre corps peut alors fabriquer des anticorps contre le sang RhD positif. Cela ne pose généralement pas de problèmes lors d'une première grossesse. Lors d'une grossesse future, ces anticorps peuvent détruire les globules rouges du bébé et causer la maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né (MHFN) entraînant des complications comme une jaunisse sévère (jaunissement de la peau et des yeux) et une anémie (faible nombre de globules rouges). Certains bébés peuvent avoir besoin de transfusions sanguines avant ou après la naissance.

Comment prévenir les complications?

Un professionnel de la santé recommande un traitement par immunoglobuline anti-D (Ig anti-D) lorsque votre statut RhD diffère de celui de votre bébé. L'Ig anti-D est un produit sanguin administré par injection. Elle empêche votre corps de fabriquer des anticorps qui pourraient nuire à une grossesse future. L'Ig anti-D est donnée à 28 semaines de grossesse, après l'accouchement et après tout événement pouvant entraîner un mélange de sang (saignement, intervention médicale ou traumatisme). Si votre bébé est RhD négatif comme vous, ce traitement n'est pas nécessaire.

Les complications peuvent être évitées à l'aide du traitement par Ig anti-D.



Dépistage du *RHD* fœtal

Ce test de dépistage est fait tôt dans votre grossesse à partir d'une prise de sang. De petits morceaux de l'ADN de votre bébé se trouvent dans votre sang. Le test les utilise pour **déterminer si votre bébé est RhD positif ou RhD négatif.**



Connaître le statut RhD de votre bébé pendant la grossesse aide à **déterminer si vous avez besoin d'un traitement par Ig anti-D.**



Environ 40 % des femmes/personnes enceintes RhD négatif portent un bébé aussi RhD négatif et **n'ont pas besoin d'un traitement par Ig anti-D.**



Le dépistage du *RHD* fœtal est très fiable et sans danger pour vous et votre bébé. **Les résultats sont exacts à plus de 99 %.**

Comment obtenir ce test

Vous pouvez faire ce test de dépistage à partir de **11 semaines** de grossesse.

1

Discutez du test avec un professionnel de la santé

Si ce test vous convient, il vous remettra une requête pour que vous puissiez le faire.

2

Faites votre prise de sang

Apportez votre requête au laboratoire pour faire votre prise de sang.

3

Attendez vos résultats

Les résultats sont habituellement disponibles dans un délai de 10 jours ouvrables et sont envoyés directement au professionnel de la santé.

4

Discutez de vos résultats

Un professionnel de la santé vous indiquera les prochaines étapes et si un traitement par Ig anti-D est recommandé pour vous.



Qui peut faire ce test?

Le dépistage du *RHD* fœtal est financé par l'État pour toutes les femmes/personnes enceintes vivant en Ontario qui :

- » sont RhD négatif
- » n'ont pas d'anticorps anti-D
- » sont enceintes d'un seul bébé (pas de jumeaux ou plus)

Vos résultats et les prochaines étapes

Résultat du test	Ce que cela signifie	Prochaines étapes
 Positif	Votre bébé a un groupe sanguin RhD positif.	L'Ig anti-D est recommandée à 28 semaines, après l'accouchement et après tout événement pouvant causer un mélange de sang (saignement, intervention médicale ou traumatisme). Parlez à un professionnel de la santé pour savoir quand et comment recevoir ce traitement.
 Négatif	Votre bébé a un groupe sanguin RhD négatif.	Le traitement par Ig anti-D n'est pas recommandé. Vous pouvez continuer les soins prénataux de routine.

* Si le test n'a pas permis d'obtenir un résultat (**résultat non concluant ou absent**), un professionnel de la santé pourrait vous demander de refaire le test ou de traiter votre grossesse comme si votre bébé est RhD positif et recommander un traitement par Ig anti-D.

→ À l'accouchement

À la naissance, le statut RhD de votre bébé sera confirmé par un échantillon de sang du cordon ombilical. Le laboratoire d'analyse peut aussi recevoir les résultats pour assurer la qualité du test.

→ Que se passe-t-il si je ne fais pas ce test?

Si vous êtes RhD négatif et que vous ne faites pas ce test, votre grossesse sera traitée comme si le bébé est RhD positif et un traitement par Ig anti-D sera recommandé pour prévenir des complications dans les grossesses futures.

Pour plus d'informations : consultez le site web de Dépistage Prénatal Ontario ou appelez notre ligne d'information pour parler à un conseiller en génétique ou à un spécialiste du dépistage.

 prenatalscreeningontario.ca/fr  PSO@BORNOntario.ca

 Ligne d'information de DPO : 1-833-351-6490 ou 613-737-2281



Renseignez-vous
sur vos options de
dépistage prénatal sur
monparcoursdedepistage.ca

